

## Рекомендации родителям до проведения профилактической прививки

- За 3-5 дней до прививки оградить ребенка от многочисленных контактов: не стоит посещать места большого скопления людей (рынки, супермаркеты и т.п.), ездить в общественном транспорте. Необходимо избегать контактов с инфекционными больными, не допускать переохлаждений.
- За 7-8 дней до вакцинации не вводите в рацион малыша новые продукты или прикорм, а если ребенок на грудном вскармливании, то не расширяйте свою диету. Не нужно употреблять в пищу продукты, часто вызывающие аллергические реакции – шоколад, клубнику, цитрусовые и т.п.
- Накануне перед прививкой искупайте ребенка.
- На приеме у врача родители должны рассказать о том, не повышалась ли температура, не изменилось ли поведение ребенка в дни, предшествующие прививке. Если у ребенка ранее отмечались судороги и выраженные аллергические реакции на пищу и лекарства, сообщите об этом врачу. Целесообразно рассказать, как ребенок переносил предыдущие прививки.
- Не пугайте ребенка уколom, больницей и т. д. Постарайтесь объяснить (с учетом возраста) суть ситуации, не акцентируя внимания на уколе и боли. С малышом младшего возраста стоит взять с собой какую-либо игрушку, отвлекающую внимание ребенка от болевых ощущений.
- Обязательно приобретите (если у вас нет этих препаратов) детское жаропонижающее и антигистаминное средство, чтобы использовать их в случае возникновения температурной или аллергической реакции на прививку.
- В день прививки измерьте температуру тела малыша чтобы убедиться, что он здоров. В кабинете педиатр осмотрит ребенка и также проведет термометрию. В прививочный сертификат и в медицинскую карту будут внесены все сведения о произведенных ребёнку прививках.
- Не покидайте поликлинику сразу после укола. Подождите немного возле кабинета (не менее 30 минут) на случай немедленных аллергических реакций на прививку. Лучше, если в этот момент, медик будет рядом.
- После прививки возможно повышение температуры тела. Если использовалась живая вакцина (против кори, паротита, краснухи), то повышение температуры возможно и в более поздние сроки (1-11 день). В случае повышения температуры тела, при появлении в месте инъекции припухлости, уплотнения, покраснения – обратитесь за медицинской помощью.
- В течение суток после прививки не рекомендуется купать ребенка, ограничьте прогулки.



# ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

*После проведения профилактической прививки у ребенка вырабатывается высокоспецифичный иммунитет, организм приобретает частичную или полную устойчивость к данному заболеванию*



Министерство здравоохранения  
Калининградской области

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики  
и реабилитации»



# Национальный календарь профилактических прививок (0-18 лет)

В соответствии с приказом МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н (Приложение №1), с изменениями от 24.04.2019 г.

В роддоме

В прививочном кабинете

Инфекция / Возраст	Вирусный Гепатит В	Туберкулез	пневмо-кокковая инфекция	дифтерия, коклюш, столбняк	гемофильная инфекция*	полиомиелит	корь, краснуха, эп. паротит	грипп
новорожденные первые 24 часа	1							
новорожденные первые 3-7 дней		1						
1 месяц	2							
2 месяца	3*		1					
3 месяца				1	1	1		
4,5 месяца			2	2	2	2		
6 месяцев	3			3	3	3		1
7 месяцев								
8 месяцев								
12 месяцев	4*						1	
15 месяцев			3					
18 месяцев				4	4	4		
20 месяцев						5		
26 месяцев								
6 лет		2		5 без коклюша			2	Ежегодно
7 лет		2						
14 лет				6 без коклюша		6		
18 лет				Каждые 10 лет без коклюша				



\* Для детей группы риска    \*\* Делается при отрицательной реакции манту

По всем вопросам прививок обращаться в прививочные кабинеты лечебных учреждений по месту жительства

**ОТКАЗ ОТ ПРИВИВОК – НЕОПРАВДАНЫЙ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ, УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ**